



NANUT FOAL

Mangime complementare d'allattamento per puledri

Appositamente formulato per garantire: elevatissima digeribilità, moderato contenuto di lattosio e di proteine, per limitare il rischio di enteriti batteriche, elevato apporto di aminoacidi essenziali per assicurare un corretto accrescimento, potenti emulsionanti per favorire la digestione dei grassi e reidratanti per combattere la disidratazione del puledro.

PROPRIETÀ

Da usarsi nei casi di scarsa produzione di latte materno, nei puledri orfani e in caso di anemia emolitica neonatale. Per integrare o sostituire il latte materno nell'alimentazione del puledro neonato in caso di: agalassia della fattrice, produzione di latte insalubre, ittero emolitico da lattazione. Per aumentare l'apporto energetico della

razione di puledri malati. Per facilitare lo svezzamento. Ai puledri svezzati e ai cavalli adulti NANUT può essere somministrato in polvere mescolato all'abituale alimento per migliorare lo stato di nutrizione.

In tal caso dosare in ragione di 100-1000 g al giorno secondo il peso e lo stato di nutrizione dei soggetti.

COMPOSIZIONE

ANALISI CHIMICA

PROTEINA GREGGIA	14,5 %
LIPIDI GREGGI	10,0 %
CELLULOSA GREGGIA	0,3 %
CENERI GREGGE	6,0 %
L-LISINA	1,0 %
METIONINA + CISTINA	0,6 %
TRIPTOFANO	0,17 %

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Sciogliere 100 g di NANUT polvere ogni 900 ml di acqua calda. Mescolare energicamente fino ad ottenere una perfetta soluzione da somministrare tiepida fin dal primo giorno di vita dopo l'assunzione del colostro.

In condizioni fisiologiche il puledro neonato assume latte in ragione del 20% del proprio peso. I puledri ammalati possono avere fabbisogni energetici aumentati anche del 100%, ad esempio in caso di sepsi generalizzata, interventi chirurgici, stress termici, diarrea; in queste situazioni è indispensabile intervenire con l'alimentazione parenterale a supporto di quella basata sul Nanut Foal.

I seguenti dosaggi medi si riferiscono a puledri appartenenti a razze di taglia normale del peso di 50 kg alla nascita che si sviluppino secondo accrescimenti fisiologici in assenza di patologie. Fabbisogni nutritivi superiori devono essere soddisfatti aumentando la frequenza delle poppate anziché la quantità di latte ad ogni poppata.

(vedi tabella della pagina seguente)

SCHEMA DI RAZIONAMENTO

Nanut foal

ETÀ PULEDRO	NUMERO PASTI AL GIORNO	POLVERE PER PASTO	LATTE RICOSTITUITO PER PASTO (ml)	LATTE RICOSTITUITO AL GIORNO (l)
0-3 giorni	12	50	450	5,4
4 giorni	10	100	900	9
5 giorni	10	125	1125	11,25
6 giorni	10	130	1170	11,70
7 giorni	10	135	1215	12,15
2° settimana	9	180	1620	14,6
3° settimana	8	220	1980	15,84
4-5° settimana	6	300	2700	16,2
6-8° settimana	6	350	3150	18,9
9-12° settimana	6	400	3600	21,6
13-14° settimana	6	425	3825	22,95

Nel primo giorno di vita l'assunzione di NANUT FOAL può variare in funzione dell'eventuale assunzione di colostro.

PULEDRI IN FASE DI SVEZZAMENTO E CAVALLI

NANUT FOAL può essere somministrato come polvere mescolata all'abituale alimento per agevolare il passaggio all'alimentazione solida e per migliorarne la qualità e l'appetibilità. In tal caso si consiglia di somministrare 100-1000 g al giorno di Nanut Foal secondo il peso e lo stato di nutrizione del cavallo.

AVVERTENZE

Lasciare sempre a disposizione del puledro lattante acqua pulita.

CONFEZIONE

Secchiello da 5 Kg
Secchiello da 10 Kg